



100 plantes pour 100 abeilles

PLANTES

ABEILLES

Achillée <i>Achillea</i> sp. ¹	l'Andrène à pattes jaunes (<i>Andrena flavipes</i>) l'Andrène tarsue (<i>Andrena tarsata</i>) la Collète commune (<i>Colletes daviesanus</i>) Le Nomade anthénes-brunes (<i>Nomada fuscicornis</i>)
Ail <i>Allium</i> sp.	La Nomade de Fabricius (<i>Nomada fabriciana</i>)
Ajonc d'Europe <i>Ulex europaeus</i>	l'Andrène tibiale (<i>Andrena tibialis</i>) l'Andrène de Wilke (<i>Andrena wilkella</i>) la Collète lapin (<i>Colletes cunicularius</i>) l'Osmie bicolore (<i>Osmia bicolor</i>)
Alliaire <i>Alliaria petiolata</i>	l'Andrène cendrée (syn. Cinéraire) (<i>Andrena cineraria</i>)
Angélique <i>Angelica archangelica</i>	l'Hylée incongru (<i>Hylaeus incongruus</i>) le Mégachile versicolore (<i>Megachile versicolor</i>)
Anthémis des champs <i>Anthemis arvensis</i>	la Collète commune (<i>Colletes daviesanus</i>)
Arbre aux papillons <i>Buddleia</i> sp.	le Bourdon des champs (<i>Bombus pascuorum</i>)
Artichaut <i>Cynara scolymus</i>	l'Halicte de la scabieuse (<i>Halictus scabiosae</i>)
Asperge <i>Asparagus officinalis</i>	le Lasioglosme à six taches (<i>Lasioglossum sexnotatum</i>)
Aster marin <i>Tripolium pannonicum</i>	le Bourdon des mousses (<i>Bombus muscorum</i>) la Collète des prés salés (<i>Colletes halophilus</i>) l'Epéole à tâches rouges (<i>Epeorus variegatus</i>)
Aster <i>Aster</i> sp.	l'Andrène de Wilke (<i>Andrena wilkella</i>)
Aubépine <i>Crataegus monogyna</i>	l'Andrène cendrée (syn. Cinéraire) (<i>Andrena cineraria</i>) l'Andrène à cul rouge (<i>Andrena haemorrhoa</i>) l'Andrène labiée (<i>Andrena labiata</i>) l'Andrène tibiale (<i>Andrena tibialis</i>) l'Andrène variante (<i>Andrena varians</i>) l'Anthophage à pattes plumeuses (<i>Anthophora plumipes</i>) le Psithyre des champs (<i>Bombus campestris</i>) la Collète des sablières (<i>Colletes cunicularius</i>) la Collète lapin (<i>Colletes cunicularius</i>) l'Osmie bicolore (<i>Osmia bicolor</i>)
Baguenaudier <i>Colutea arborescens</i>	le Xylocope violacé (<i>Xylocopa violacea</i>)
Barbe de faucon à bec <i>Crepis vesicaria</i>	le Panurge éperonné (syn. calcaire) (<i>Panurgus calcarius</i>)
Barbe de faucons <i>Crepis jubata</i> ou <i>rhaetica</i>	le Panurge de Banks (<i>Panurgus banksianus</i>)
Baume indien <i>Impatiens glandulifera</i>	le Bourdon des champs (<i>Bombus pascuorum</i>)
Berce <i>Heracleum sphondylium</i>	l'Andrène greffée (<i>Andrena coitana</i>)

Bruyère <i>Calluna vulgaris</i>	l'Andrène tarsue (Andrena tarsata) le bourdon des landes (Bombus jonellus) le bourdon des forêts (Bombus lucorum) le bourdon des mousses (Bombus muscorum) le Bourdon Danois (Bombus soroeensis) la Collète des bruyères (Colletes succinctus) l'Epéole croisée (Epeolus cruciger) l'Halicte confu (Halictus cunfusus) le Lasioglosse des bois (Lasioglossum frettellum) la Nomade pattes rouges (Nomada rufipes)
Bryone dioïque <i>Bryonia dioiqua</i>	l'Andrène de la bryone (Andrena florea) le Célioixe conique (Coelioxys conica) le Lasioglosse à six taches (Lasioglossum sexnotatum)
Bugle rampant <i>Ajuga reptans</i>	l'Osmie bicolore (Osmia bicolor)
Buglosse d'Italie <i>Anchusa azurea</i>	la Collète des prés salés (Colletes halophilus)
Buisson ardent <i>Pyracantha coccinea</i>	le bourdon des arbres (Bombus hipnorum)
Camomille <i>Chamaemelum nobile</i>	la Collète commune (Colletes daviesanus)
Campanule <i>Campanula sp.</i>	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) l'Andrène greffée (Andrena coitana) l'Andrène tarsue (Andrena tarsata) le Bourdon Danois (Bombus soroeensis) le Chélostome raiponce (syn. Des campanules) (Chelostoma rapunculi) le Lasioglosse des bois (Lasioglossum frettellum) la Mégachile de willughby (Megachile willughbiella) la Mélitte à cul rouge (syn. des campanules) (Melitta haemorrhoidalis)
Cardère <i>Dipsacus sp.</i>	le Bourdon des jardins (Bombus hotorum) le Bourdon grisé (Bombus sylvarum)
Centaurée <i>Centaurea sp.</i>	l'Andrène greffée (Andrena coitana) l'Andrène de la knautie (Andrena hattorfiana) l'Andrène de la scabieuse (Andrena marginata) le Psithyre des champs (Bombus campestris) le Bourdon des forêts (Bombus lucorum) le Bourdon des mousses (Bombus muscorum) le Bourdon des champs (Bombus pascuorum) le Bourdon Danois (Bombus soroeensis) le Bourdon terrestre (Bombus terrestris) l'Halicte pattes rouges (Halictus rubicundus) l'Halicte de la scabieuse (Halictus scabiosae) le Lasioglosse pattes blanches (Lasioglossum alibipes) le Lasioglosse chaussée (syn. Commun) (Lasioglossum calceatum) la Mégachile versicolore (Megachile versicolor)

Chardon <i>Eryngium sp.</i>	l'Ammobate ponctuée (Ammobates punctatus) l'Andrène greffée (Andrena coitana) l'Andrène de la scabieuse (Andrena marginata) l'Anthidie à manchettes (Anthidium manicatum) l'Anthophage à quatre tâches (syn. rusée) (Anthophora quadrimaculata) le Psithyre des champs (Bombus campestris) le bourdon des jardins (Bombus hotorum) le Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) le bourdon des forêts (Bombus lucorum) le bourdon des mousses (Bombus muscorum) le Bourdon des champs (Bombus pascuorum) le Psithyre des rochers (Bombus rupestris) le Bourdon terrestre (Bombus terrestris) le Célioixe roussâtre (Coelioxys rufescens) le Dasypode hirsute (syn. À culottes) (Desypoda hirtipes) l'Halicte pattes rouges (Halictus rubicundus) l'Halicte de la scabieuse (Halictus scabiosae) l'Hylée commun (syn. Abeille masquée commune) (Hylaeus communis) l'Abeille masquée hyaline (Hylaeus Hyalinatus) l'Hylée incongru (Hylaeus incongruus) le lasioglosse pattes blanches (Lasioglossum albitipes) le lasioglosse chaussée (syn. Commun) (Lasioglossum calceatum)
Chélidoine <i>Chelidonium majus</i>	le bourdon des jardins (Bombus hotorum) le bourdon des forêts (Bombus lucorum)
Chévrefeuille <i>Lonicera sp.</i>	le bourdon des jardins (Bombus hotorum) le bourdon des forêts (Bombus lucorum)
Chicorée sauvage <i>Cichorium intybus</i>	le Dasypode hirsute (syn. À culottes) (Desypoda hirtipes) l'Halicte de la scabieuse (Halictus scabiosae)
Chicorée sauvage <i>Cichorium intybus</i>	le Dasypode hirsute (syn. À culottes) (Desypoda hirtipes) l'Halicte de la scabieuse (Halictus scabiosae)
Chrysanthème simple <i>Chrysanthemum sp.</i>	l'Osmie deux angles (Osmia leaiana)
Cirse des marais <i>Cirsium palustre</i>	le Macropède à pattes brun-jaune (Macropis fulvipes) l'Ammobate ponctuée l'Anthophage à quatre tâches (syn. rusée) le Bourdon terrestre l'Hylée commun (syn. Abeille masquée commune) l'Abeille masquée hyaline la Nomade à pattes jaunes
Cirse <i>Cirsium sp.</i>	l'Andrène claire le Bourdon des pierres le Psithyre des rochers l'Osmie rousse
Colza <i>Brassica napus</i>	l'Andrène de la bryone (Andrena florea)
Concombre d'âne <i>Ecballium elaterium</i>	l'Anthophage à pattes plumeuses (Anthophora plumipes)
Consoude <i>Symphtym officinalis</i>	l'Osmie dorée (Osmia aurulenta)
Coquelicot cornu <i>Glaucium flavum</i>	le lasioglosse à six taches (Lasioglossum sexnotatum)
Coquelicot <i>Papaver rhoeas</i>	l'Andrène variante (Andrena varians) le bourdon des arbres (Bombus hipnorum)
Cotoneaster <i>Cotoneaster sp.</i>	le bourdon des jardins (Bombus hotorum) le Bourdon des champs (Bombus pascuorum)

Epiaire de Byzance <i>Stachys byzantina</i>	l'Ammobate ponctuée (Ammobates punctatus) l'Anthidie à manchettes (Anthidium manicatum) l'Anthophore à quatre tâches (syn. rusée) (Anthophora quadrimaculata) la Mégachile de la gesse (Megachile ericetorum)
Epiaire <i>Stachys sp.</i>	l'Ammobate ponctuée l'Anthidie à manchettes l'Anthophore à quatre tâches (syn. rusée) la Mégachile de la gesse
Epilobe <i>Epilobium sp.</i>	l'Andrène de la scabieuse (Andrena marginata)
Euphorbe des bois <i>Euphorbia amygdaloides</i>	l'Andrène de la knautie (Andrena hattorfiana) la Nomade de Panzer (Nomada panzeri)
Famille des Apiacées	l'Andrène pattes d'or (Andrena chrysosceles) l'Andrène de Clarke (syn. À pattes rouges) (Andrena clarkei) La Micrandrène demi-lisse (Andrena semilaevis) La Micrandrène sub-opaque (Andrena subopaca) l'Andrène variante (Andrena varians) l'Andrène de Wilke (Andrena wilkella) l'Hylée antennes courtes (Hylaeus brevicornis) l'Hylée commun (syn. Abeille masquée commune) (Hylaeus communis) l'Abeille masquée hyaline (Hylaeus Hyalinatus) Lasioglosse pattes blanches (Lasioglossum albipes) La Macropède commune (Macropis europaea) Le Sphécode gibeux (Sphecodes gibus) Le Sphécode grosse tête (Sphecodes monilicornis)
Famille des Cucurbitacées	l'Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes)
Famille des Lamiacées	le bourdon des jardins (Bombus horotorum) le Célioxys roussâtre (Coelioxys rufescens) l'Osmie bleutée (Osmia caerulescens)
Famille des Lamiacées	le bourdon des jardins (Bombus horotorum) le Célioxys roussâtre (Coelioxys rufescens) l'Osmie bleutée (Osmia caerulescens)
Famille des Astéracées	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) l'Andrène de la tanaisie (Andrena denticulata) l'Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes) l'Andrène labiée (Andrena labiata) le Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) la Collète commune (Colletes daviesanus) la Collète du lierre (Colletes hederae) le Dasypode hirsute (syn. À culottes) (Desypoda hirtipes) l'Halicte de la scabieuse (Halictus scabiosae) l'Hériade des troncs (Heriades truncorum) l'Hylée commun (syn. Abeille masquée commune) (Hylaeus communis) le Lasioglosse chaussée (syn. Commun) (Lasioglossum calceatum) le Lasioglosse pieds blancs (Lasioglossum leucopus) le Lasioglosse semi-brillante (Lasioglossum semi-lucens) la Mégachile de willughby (Megachile willughbiella) le Nomade anthénès-brunes (Nomada fuscicornis) la Nomade à pattes jaunes (Nomada goodeniana) le Nomade semblable (Nomada similis) l'Osmie bicolore (Osmia bicolor) le Sphécode gibeux (Sphecodes gibus) le Sphécode grosse tête (Sphecodes monilicornis)

Famille des Astéracées

l'Andrène bicolore (*Andrena bicolor*)
l'Andrène de la tanaisie (*Andrena denticulata*)
l'Andrène à pattes jaunes (*Andrena flavipes*)
l'Andrène labiée (*Andrena labiata*)
le Bourdon des pierres (*Bombus lapidarius*)
la Collète commune (*Colletes daviesanus*)
la Collète du lierre (*Colletes hederae*)
le Dasypode hirsute (syn. À culottes) (*Desypoda hirtipes*)
l'Halicte de la scabieuse (*Halictus scabiosae*)
l'Hériade des troncs (*Heriades truncorum*)
l'Hylée commun (syn. Abeille masquée commune)
(*Hylaeus communis*)
le Lasioglosse chaussée (syn. Commun) (*Lasioglossum calceatum*)
le Lasioglosse pieds blancs (*Lasioglossum leucopodus*)
le Lasioglosse semi-brillante (*Lasioglossum semi-lucens*)
la Mégachile de willughby (*Megachile willughbiella*)
le Nomade anthénes-brunes (*Nomada fuscicornis*)
la Nomade à pattes jaunes (*Nomada goodeniana*)
le Nomade semblable (*Nomada similis*)
l'Osmie bicolore (*Osmia bicolor*)
le Sphécode gibeux (*Sphecodes gibus*)
le Sphécode grosse tête (*Sphecodes monilicornis*)

Famille des Astéracées

l'Andrène bicolore (*Andrena bicolor*)
l'Andrène de la tanaisie (*Andrena denticulata*)
l'Andrène à pattes jaunes (*Andrena flavipes*)
l'Andrène labiée (*Andrena labiata*)
le Bourdon des pierres (*Bombus lapidarius*)
la Collète commune (*Colletes daviesanus*)
la Collète du lierre (*Colletes hederae*)
le Dasypode hirsute (syn. À culottes) (*Desypoda hirtipes*)
l'Halicte de la scabieuse (*Halictus scabiosae*)
l'Hériade des troncs (*Heriades truncorum*)
l'Hylée commun (syn. Abeille masquée commune)
(*Hylaeus communis*)
le Lasioglosse chaussée (syn. Commun) (*Lasioglossum calceatum*)
le Lasioglosse pieds blancs (*Lasioglossum leucopodus*)
le Lasioglosse semi-brillante (*Lasioglossum semi-lucens*)
la Mégachile de willughby (*Megachile willughbiella*)
le Nomade anthénes-brunes (*Nomada fuscicornis*)
la Nomade à pattes jaunes (*Nomada goodeniana*)
le Nomade semblable (*Nomada similis*)
l'Osmie bicolore (*Osmia bicolor*)
le Sphécode gibeux (*Sphecodes gibus*)
le Sphécode grosse tête (*Sphecodes monilicornis*)

Famille des Asteracées à fleurs jaunes

le Panurge éperonné (syn. calcaire) (*Panurgus calcarius*)

Famille des Asteracées à fleurs jaunes

le Panurge éperonné (syn. calcaire) (*Panurgus calcarius*)

Famille des Asteracées à fleurs jaunes

le Panurge éperonné (syn. calcaire) (*Panurgus calcarius*)

Famille des Asteracées à fleurs jaunes

le Panurge éperonné (syn. calcaire) (*Panurgus calcarius*)

Famille des Boraginacées

l'Osmie bicolore (*Osmia bicolor*)

Famille des Brassicacées	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) l'Andrène pattes d'or (Andrena chrysosceles) l'Andrène cendrée (syn. Cinéraire) (Andrena cineraria) l'Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes) l'Andrène labiée (Andrena labiata) l'Andrène noire-bronze (Andrena nigroaenea)
Famille des Ericacées	la Collète du lierre (Colletes hederae)
Famille des Fabacées	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) l'Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes) l'Andrène de Wilke (Andrena wilkella) l'Anthidie à manchettes (Anthidium manicatum) le bourdon des mousses (Bombus muscorum) l'Eucère à longues antennes (Eucera longicornis) la Mélitte de la luzerne (Melitta leporina) le Xylocope violacé (Xylocopa violacea)
Famille des Rosacées	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) l'Andrène claire (Andrena helvola) l'Andrène labiée (Andrena labiata) l'Andrène noire-bronze (Andrena nigroaenea) le bourdon des arbres (Bombus hipnorum) l'Hylée commun (syn. Abeille masquée commune) (Hylaeus communis) le lasioglosse chaussée (syn. Commun) (Lasioglossum calceatum) le lasioglosse des bois (Lasioglossum frettellum) le lasioglosse pieds blancs (Lasioglossum leucopodus) la Mélècte commune (Melecta albifrons)
Fraisier des bois <i>Fragaria vesca</i>	l'Osmie dorée (Osmia aurulenta)
Framboise <i>Rubus ideaus</i>	le bourdon des arbres (Bombus hipnorum) le bourdon des prés (Bombus pratorum)
Genet <i>Genista sp.</i>	l'Andrène de Wilke (Andrena wilkella)
Geranium à Robert <i>Geranium robertianum</i>	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) la Mélitte à cul rouge (syn. des campanules) (Melitta haemorrhoidalis) l'Osmie deux angles (Osmia leaiana)
Géranium vivace <i>Geranium sp.</i>	le Chélostome raiponce (syn. Des campanules) (Chelostoma rapunculi) la Mégachile de willughby (Megachile willughbiella)
Gesse à grande fleur <i>Lathyrus latifolius</i>	la Mégachile de la gesse (Megachile ericetorum)
Giroflée <i>Matthiola incana</i>	le bourdon des arbres (Bombus hipnorum) la Mélècte commune (Melecta albifrons)
Glycine <i>Wisteria sp.</i>	le Xylocope violacé (Xylocopa violacea)
Grande stellaire <i>Stellaria neglecta</i>	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor)
Groseiller <i>Ribes sp.</i>	l'Andrène fauve (Andrena fulva) le bourdon des prés (Bombus pratorum)
Hippocrépide à toupet <i>Hippocrepis comosa</i>	l'Osmie bicolore (Osmia bicolor)
Immortelle <i>Helichrysum italicum</i>	le Bourdon grisé (Bombus sylvarum) l'Eucère à longues antennes (Eucera longicornis)
Jacinthe <i>Hyacinthus X</i>	l'Andrène cendrée (syn. Cinéraire) (Andrena cineraria) l'Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes) l'Andrène fauve (Andrena fulva) l'Osmie rousse (Osmia bicornis)

Knautie <i>Knautia sp.</i>	l'Andrène de la knautie (<i>Andrena hattorfiana</i>)
Lamier tacheté <i>Lamium maculatum</i>	l'Anthophore à pattes plumeuses (<i>Anthophora plumipes</i>)
Lavande <i>Lavandula sp.</i>	l'Ammobate ponctuée (<i>Ammobates punctatus</i>) l'Anthidie à manchettes (<i>Anthidium manicatum</i>) l'Anthophore à quatre tâches (syn. rusée) (<i>Anthophora quadrimaculata</i>) le Bourdon terrestre (<i>Bombus terrestris</i>)
Les arbres fruitiers	l'Andrène cendrée (syn. Cinéraire) (<i>Andrena cineraria</i>) l'Andrène à pattes jaunes (<i>Andrena flavipes</i>) l'Andrène fauve (<i>Andrena fulva</i>) l'Andrène à cul rouge (<i>Andrena haemorrhoa</i>) l'Andrène noire-bronze (<i>Andrena nigroaenea</i>) l'Andrène variante (<i>Andrena varians</i>) Le bourdon des arbres (<i>Bombus hipnorum</i>) Le Bourdon des pierres (<i>Bombus lapidarius</i>) Lasioglosse chaussée (syn. Commun) (<i>Lasioglossum calceatum</i>) Lasioglosse pieds blancs (<i>Lasioglossum leucoporus</i>) La Mélècte commune (<i>Melecta albifrons</i>) La Nomade de Marcham (<i>Nomada marchamella</i>) l'Osmie rousse (<i>Osmia bicornis</i>) l'Osmie cornue (<i>Osmia cornuta</i>) le Xylocope violacé (<i>Xylocopa violacea</i>)
Les arbres fruitiers	l'Andrène cendrée (syn. Cinéraire) (<i>Andrena cineraria</i>) l'Andrène à pattes jaunes (<i>Andrena flavipes</i>) l'Andrène fauve (<i>Andrena fulva</i>) l'Andrène à cul rouge (<i>Andrena haemorrhoa</i>) l'Andrène noire-bronze (<i>Andrena nigroaenea</i>) l'Andrène variante (<i>Andrena varians</i>) Le bourdon des arbres (<i>Bombus hipnorum</i>) Le Bourdon des pierres (<i>Bombus lapidarius</i>) Lasioglosse chaussée (syn. Commun) (<i>Lasioglossum calceatum</i>) Lasioglosse pieds blancs (<i>Lasioglossum leucoporus</i>) La Mélècte commune (<i>Melecta albifrons</i>) La Nomade de Marcham (<i>Nomada marchamella</i>) l'Osmie rousse (<i>Osmia bicornis</i>) l'Osmie cornue (<i>Osmia cornuta</i>) le Xylocope violacé (<i>Xylocopa violacea</i>)
Lierre terrestre <i>Glechoma hederacea</i>	l'Anthophore à pattes plumeuses (<i>Anthophora plumipes</i>) l'Eucère à longues antennes (<i>Eucera longicornis</i>) l'Osmie dorée (<i>Osmia aurulenta</i>)
Lierre terrestre <i>Glechoma hederacea 'Variegata'</i>	l'Anthophore à pattes plumeuses (<i>Anthophora plumipes</i>) l'Eucère à longues antennes (<i>Eucera longicornis</i>) l'Osmie dorée (<i>Osmia aurulenta</i>)
Lierre <i>Hedera helix</i>	le Bourdon terrestre (<i>Bombus terrestris</i>) la Collète du lierre (<i>Colletes hederae</i>)
Liondent d'automne <i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>	le Panurge éperonné (syn. calcaire) (<i>Panurgus calcarius</i>)
Lotier corniculé <i>Lotus corniculatus</i>	l'Andrène de Wilke (<i>Andrena wilkella</i>) l'Anthidie à manchettes (<i>Anthidium manicatum</i>) le Bourdon des pierres (<i>Bombus lapidarius</i>) le Célioche conique (<i>Coelioxys conica</i>) le Célioche allongé (<i>Coelioxys elongata</i>) le Célioche inerme (<i>Coelioxys inermis</i>) l'Eucère à longues antennes (<i>Eucera longicornis</i>) l'Osmie épines jaunes (<i>Hoplitis claviventris</i>) la Mégachile de willughby (<i>Megachile willughbiella</i>) l'Osmie dorée (<i>Osmia aurulenta</i>)

Luzerne <i>Medicago sativa</i>	l'Eucère à longues antennes (Eucera longicornis) la Mélitte de la luzerne (Melitta leporina)
Lycope d'Europe <i>Lycopus europaeus</i>	le Macropède à pattes brun-jaune (Macropis fulvipes)
Lysimaque <i>Lysimachia sp.</i>	la Macropède commune (Macropis europaea) le Macropède à pattes brun-jaune (Macropis fulvipes)
Lysimaque <i>Lysimachia sp.</i>	la Macropède commune (Macropis europaea) le Macropède à pattes brun-jaune (Macropis fulvipes)
Marguegite <i>Leucanthemum sp.</i>	
Marguerite de saint michel <i>Aster amellus</i>	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) le Psithyre des rochers (Bombus rupestris) la Collète commune (Colletes daviesanus)
Mauve <i>Malva sp.</i>	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) le Chélostome raiponce (syn. Des campanules) (Chelostoma rapunculi) la Mélitte à cul rouge (syn. des campanules) (Melitta haemorrhoidalis)
Mélilot <i>Melilotus sp.</i>	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) le Psithyre des rochers (Bombus rupestris) la Collète commune (Colletes daviesanus)
Menthe aquatique <i>Mentha aquatica</i>	la Macropède commune (Macropis europaea)
Menthe <i>Mentha sp.</i>	le Lasioglosse à six taches (Lasioglossum sexnotatum)
Moutarde <i>Brassica juncea</i>	la Nomade de Fabricius (Nomada fabriciana)
Muflier <i>Antirrhinum sp.</i>	l'Osmie bleutée (Osmia caerulescens)
Muscaris <i>Muscaris sp.</i>	l'Anthophore à pattes plumeuses (Anthophora plumipes) l'Osmie cornue (Osmia cornuta)
Myrtillier <i>Vaccinium sp.</i>	le bourdon des arbres (Bombus hipnorum)
Onopordon <i>Onopordum acanthium</i>	le Xylocope violacé (Xylocopa violacea)
Ophrys araignée <i>Ophrys sphegodes</i>	l'Andrène noire-bronze (Andrena nigroaenea)
Ophrys de Marseille <i>Ophrys aranifera subsp. Massiliensis</i>	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor)
Ophrys des lupercales <i>Ophrys fusca</i>	l'Andrène bicolore (Andrena bicolor) l'Andrène noire-bronze (Andrena nigroaenea)
Orcanette des teinturiers <i>Alkanna tinctoria</i>	l'Osmie deux angles (Osmia leaiana)
Oreille de souris <i>Cerastium biebersteinii</i>	le Panurge de Banks (Panurgus banksianus) le Panurge éperonné (syn. calcaire) (Panurgus calcarius)
Orpin <i>Sedum sp.</i>	le Xylocope violacé (Xylocopa violacea)
Ortie Blanche <i>Lamium album</i>	le Bourdon des arbres (Bombus hipnorum)
Ortie <i>Urtica dioica</i>	l'Anthophore à pattes plumeuses (Anthophora plumipes)
Panaïs <i>Pastinaca sativa</i>	l'Andrène de la knautie (Andrena hattorfiana) l'Hylée incongru (Hylaeus incongruus)
Persil des vaches <i>Anthriscus sylvestris</i>	la Nomade de Panzer (Nomada panzeri)

Picride fausse épervière <i>Picris hieracoides</i>	le Dasypode hirsute (syn. À culottes) (<i>Desypoda hirtipes</i>) le Panurge éperonné (syn. calcaire) (<i>Panurgus calcatus</i>)
Pissenlit <i>Taraxacum officinale</i>	l'Andrène bicolore (<i>Andrena bicolor</i>) l'Andrène pattes d'or (<i>Andrena chrysosceles</i>) l'Andrène cendrée (syn. Cinéraire) (<i>Andrena cineraria</i>) l'Andrène de Clarke (syn. À pattes rouges) (<i>Andrena clarkella</i>) l'Andrène à pattes jaunes (<i>Andrena flavipes</i>) l'Andrène fauve (<i>Andrena fulva</i>) l'Andrène claire (<i>Andrena helvola</i>) l'Andrène noire-bronze (<i>Andrena nigroaenea</i>) l'Andrène tibiale (<i>Andrena tibialis</i>) l'Andrène variante (<i>Andrena varians</i>) le Psithyre des champs (<i>Bombus campestris</i>) le Psithyre des rochers (<i>Bombus rupestris</i>) l'Hylée incongru (<i>Hylaeus incongruus</i>) la Mélècte commune (<i>Melecta albifrons</i>) la Nomade de Fabricius (<i>Nomada fabriciana</i>) la Nomade à pattes jaunes (<i>Nomada goodeniana</i>) la Nomade de l'épervière (<i>Nomada integra</i>) la Nomade poils-de-carotte (<i>Nomada lathburiana</i>) la Nomade de Panzer (<i>Nomada panzeri</i>) l'Osmie dorée (<i>Osmia aurulenta</i>) l'Osmie bicolore (<i>Osmia bicolor</i>) l'Osmie rousse (<i>Osmia bicornis</i>) le Sphécode commun (<i>Sphecodes ephippius</i>)
Pois de senteur vivace <i>Lathyrus latifolius</i>	la Mégachile de la gesse (<i>Megachile ericetorum</i>) la Mégachile de willughby (<i>Megachile willughbiella</i>)
Potentille arbustive <i>Dasiphora fruticosa</i>	l'Andrène tarsue (<i>Andrena tarsata</i>) l'Halicte confu (<i>Halictus cunfusus</i>) le lasioglosse semi-brillante (<i>Lasioglossum semilucens</i>) la Nomade fardée (<i>Nomada fucata</i>)
Potentille <i>Potentilla sp.</i>	l'Andrène bicolore (<i>Andrena bicolor</i>) la Mégachile de willughby (<i>Megachile willughbiella</i>)
Primevère <i>Primula sp.</i>	l'Anthophore à pattes plumeuses (<i>Anthophora plumipes</i>)
Prunelier <i>Prunus spinosa</i>	l'Andrène claire (<i>Andrena helvola</i>) l'Andrène tibiale (<i>Andrena tibialis</i>) l'Andrène variante (<i>Andrena varians</i>) la Collète des sablières (<i>Colletes cunicularius</i>) la Collète lapin (<i>Colletes cunicularius</i>) l'Halicte dorée commune (<i>Halictus tumulorum</i>) le lasioglosse vert sombre (<i>Lasioglossum morio</i>) l'Osmie bicolore (<i>Osmia bicolor</i>)
Pulmonaire <i>Pulmonaria sp.</i>	l'Anthophore à pattes plumeuses (<i>Anthophora plumipes</i>) le bourdon des arbres (<i>Bombus hipnorum</i>) l'Osmie cornue (<i>Osmia cornuta</i>) l'Osmie deux angles (<i>Osmia leaiana</i>)
Reine des prés <i>Filipendula ulmaria</i>	l'Andrène de la scabieuse (<i>Andrena marginata</i>)
Renoncule <i>ranunculus sp.</i>	l'Andrène pattes d'or (<i>Andrena chrysosceles</i>) l'Andrène labiée (<i>Andrena labiata</i>) l'Osmie épines jaunes (<i>Hoplitis claviventris</i>) le lasioglosse à six taches (<i>Lasioglossum sexnotatum</i>) la Nomade de Fabricius (<i>Nomada fabriciana</i>) la Nomade fardée (<i>Nomada fucata</i>) la Nomade de l'épervière (<i>Nomada integra</i>)
Rhododendron <i>Rhododendron sp.</i>	le bourdon des arbres (<i>Bombus hipnorum</i>) le bourdon des prés (<i>Bombus pratorum</i>)

Ronce
Rubus fruticosus

l'Andrène bicolore (Andrena bicolor)
l'Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes)
l'Andrène de la scabieuse (Andrena marginata)
l'Andrène tarsue (Andrena tarsata)
le Psithyre des champs (Bombus campestris)
le Bourdon des pierres (Bombus lapidarius)
le bourdon des forêts (Bombus lucorum)
le bourdon des mousses (Bombus muscorum)
le bourdon des prés (Bombus pratorum)
le Psithyre des rochers (Bombus rupestris)
le Bourdon grisé (Bombus sylvarum)
le Bourdon terrestre (Bombus terrestris)
le Célioche inerme (Coelioxys inermis)
le Célioche roussâtre (Coelioxys rufescens)
l'Halicte confu (Halictus cunfusus)
l'Hylée antennes courtes (Hylaeus brevicornis)
l'Hylée incongru (Hylaeus incongruus)
le lasioglosse des bois (Lasioglossum fretellum)
le lasioglosse à six taches (Lasioglossum sexnotatum)
la Macropède commune (Macropis europaea)
le Mégachile versicolore (Megachile versicolor)
l'Osmie dorée (Osmia aurulenta)

Rose
Rosa X

l'Andrène bicolore (Andrena bicolor)
l'Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes)
l'Andrène de la scabieuse (Andrena marginata)
l'Andrène tarsue (Andrena tarsata)
le Psithyre des champs (Bombus campestris)
le Bourdon des pierres (Bombus lapidarius)
le bourdon des forêts (Bombus lucorum)
le bourdon des mousses (Bombus muscorum)
le bourdon des prés (Bombus pratorum)
le Psithyre des rochers (Bombus rupestris)
le Bourdon grisé (Bombus sylvarum)
le Bourdon terrestre (Bombus terrestris)
le Célioche inerme (Coelioxys inermis)
le Célioche roussâtre (Coelioxys rufescens)
l'Halicte confu (Halictus cunfusus)
l'Hylée antennes courtes (Hylaeus brevicornis)
l'Hylée incongru (Hylaeus incongruus)
le lasioglosse des bois (Lasioglossum fretellum)
le lasioglosse à six taches (Lasioglossum sexnotatum)
la Macropède commune (Macropis europaea)
le Mégachile versicolore (Megachile versicolor)
l'Osmie dorée (Osmia aurulenta)

Sabot de Venus
Cypripedium calceolus

l'Andrène à cul rouge (Andrena haemorrhoa)

Salicaire
Lythrum salicaria

le Macropède à pattes brun-jaune (Macropis fulvipes)

Sauge
Salvia sp.

l'Ammobate ponctuée (Ammobates punctatus)
l'Anthidie à manchettes (Anthidium manicatum)
l'Anthophore à quatre tâches (syn. rusée) (Anthophora quadrimaculata)
la Mégachile de la gesse (Megachile ericetorum)
l'Osmie bicolore (Osmia bicolor)

Saule <i>Salix caprea</i>	l'Andrène de Clarke (syn. À pattes rouges) (<i>Andrena clarkella</i>) l'Andrène à cul rouge (<i>Andrena haemorrhoa</i>) l'Andrène claire (<i>Andrena helvola</i>) l'Andrène précoce (<i>Andrena praecox</i>) l'Andrène tibiale (<i>Andrena tibialis</i>) l'Andrène vague (<i>Andrena vaga</i>) le bourdon des arbres (<i>Bombus hipnorum</i>) le bourdon des landes (<i>Bombus jonellus</i>) le bourdon des prés (<i>Bombus pratorum</i>) la Collète des sablières (<i>Colletes cunicularius</i>) la Collète lapin (<i>Colletes cunicularius</i>) l'Halicte dorée commune (<i>Halictus tumulorum</i>) le lasioglosse des bois (<i>Lasioglossum retellum</i>) le lasioglosse vert sombre (<i>Lasioglossum morio</i>) la Nomade à pattes jaunes (<i>Nomada goodeniana</i>) l'Osmie cornue (<i>Osmia cornuta</i>)
Scabieuse colombaire <i>Scabiosa columbaria</i>	l'Andrène de la knautie (<i>Andrena hattorfiana</i>) l'Andrène de la scabieuse (<i>Andrena marginata</i>) le Psithyre des champs (<i>Bombus campestris</i>) le Bourdon des champs (<i>Bombus pascuorum</i>) le Bourdon Danois (<i>Bombus soroeensis</i>) le Bourdon grisé (<i>Bombus sylvarum</i>) la Nomade armée (<i>Nomada armata</i>)
Scabieuse <i>Scabiosa sp.</i>	l'Andrène de la knautie (<i>Andrena hattorfiana</i>) l'Andrène de la scabieuse (<i>Andrena marginata</i>) le Psithyre des champs (<i>Bombus campestris</i>) le Bourdon des champs (<i>Bombus pascuorum</i>) le Bourdon Danois (<i>Bombus soroeensis</i>) le Bourdon grisé (<i>Bombus sylvarum</i>) la Nomade armée (<i>Nomada armata</i>)
Scille <i>Scilla peruviana</i>	l'Andrène cendrée (syn. Cinéraire) (<i>Andrena cineraria</i>) l'Andrène fauve (<i>Andrena fulva</i>) l'Osmie rousse (<i>Osmia bicornis</i>)
Scrofulaire noueuse <i>Scrophularia nodosa</i>	l'Halicte de la scabieuse (<i>Halictus scabiosae</i>) le lasioglosse à six taches (<i>Lasioglossum sexnotatum</i>)
Séneçons <i>Senecio sp.</i>	l'Andrène greffée (<i>Andrena coitana</i>) la Collète commune (<i>Colletes daviesanus</i>) la Collète des prés salés (<i>Colletes halophilus</i>) l'Epéole croisée (<i>Epeorus cruciger</i>) l'Epéole à tâches rouges (<i>Epeorus variegatus</i>) l'Hériade des troncs (<i>Heriades truncorum</i>) le lasioglosse chaussée (syn. Commun) (<i>Lasioglossum calceatum</i>) la Nomade anthénes-brunes (<i>Nomada fuscicornis</i>) la Nomade pattes rouges (<i>Nomada rufipes</i>)
Tanaisie <i>Tanacetum sp.</i>	la Collète commune (<i>Colletes daviesanus</i>)
Thym <i>Thymus sp.</i>	l'Andrène bicolore (<i>Andrena bicolor</i>) le bourdon des landes (<i>Bombus jonellus</i>) l'Hylée antennes courtes (<i>Hylaeus brevicornis</i>) la Nomade pattes rouges (<i>Nomada rufipes</i>)
Tormentille <i>Potentilla erecta</i>	l'Andrène tarsue (<i>Andrena tarsata</i>) la Nomade semblable (<i>Nomada similis</i>)
Trèfle <i>Trifolium repens</i>	l'Andrène de la knautie (<i>Andrena hattorfiana</i>) le Psithyre des champs (<i>Bombus campestris</i>) le bourdon des mousses (<i>Bombus muscorum</i>) le bourdon des prés (<i>Bombus pratorum</i>) le Bourdon grisé (<i>Bombus sylvarum</i>) l'Eucère à longues antennes (<i>Eucera longicornis</i>) l'Osmie épines jaunes (<i>Hoplitis claviventris</i>) la Mélitte de la luzerne (<i>Melitta leporina</i>) l'Osmie bleutée (<i>Osmia caeruleascens</i>)

Tussilage Tussilago farfara	l'Andrène de Clarke (syn. À pattes rouges) (Andrena clarkella) l'Andrène tibiale (Andrena tibialis) l'Andrène variante (Andrena varians)
Vergerette commune Erigeron annuus	le Célioixe allongé (Coelioxys elongata) l'Epéole à tâches rouges (Epeolus variegatus) l'Hériade des troncs (Heriades truncorum) le lasioglosse bandes blanches (Lasioglossum leucozonium)
Véronique germandrée Veronica teucrium	la Nomade poils-de-carotte (Nomada lathburiana) l'Osmie bleutée (Osmia caerulescens)
Véronique Veronica sp.	l'Andrène pattes d'or (Andrena chrysosceles) l'Andrène labiée (Andrena labiata) la Micrandrène demi-lisse (Andrena semilaevis) l'Halicte confu (Halictus cunfusus) le lasioglosse quatre points (Lasioglossum quadrinotatum)
Vesce renale Anthyllis vulneraria	le Psithyre des rochers (Bombus rupestris) l'Eucère à longues antennes (Eucera longicornis)
Vesce Viscia sativa	l'Andrène de Wilke (Andrena wilkella) l'Eucère à longues antennes (Eucera longicornis) l'Osmie épines jaunes (Hoplitis claviventris) la Mélitte de la luzerne (Melitta leporina) le Xylocope violacé (Xylocopa violacea)
Vipérine Echium vulgare	l'Anthophage à quatre tâches (syn. rusée) (Anthophora quadrimaculata) le bourdon des forêts (Bombus lucorum) le bourdon des mousses (Bombus muscorum) l'Osmie de la vipérine (Hoplitis adunca)